



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 23 du 21 Septembre 2005 - 1 page

COLZA : Stade cotylédons à 4 feuilles

Petites altises

Comme souvent la **situation** est très **hétérogène**, voire très **contrastée** d'une parcelle à l'autre. Les parcelles très atteintes côtoient celles indemnes de piqures.

Quoiqu'il en soit, la **lutte s'impose** dès que vous atteignez le seuil de **30 % de pieds avec piqures**.

Sauf en cas d'absolue nécessité, éviter les traitements à des stades trop jeunes de la culture (cotylédons peu développés) ; vous exposant à une obligation de renouvellement de la protection (efficacité de courte durée).

A partir de B2, les interventions ne sont plus justifiées.

Tenthredes

Le vol se poursuit (plus de 100 captures d'adultes à ce jour). Il est biologiquement trop tôt pour observer des dégâts de larves.

Il est trop tôt pour intervenir.

Grosses altises

Le vol a **débuté** le 16 septembre sur le sud de la région. **Treize captures** ont été enregistrées et symbolisent un début de **vol hésitant**.

Le traitement sera positionné si nécessaire (en fonction des captures), autour du 10 octobre.

Il pourrait, comme l'année passée, servir de traitement mixte Altises-Larves de tenthrèdes.

Affaire à suivre dans les prochains bulletins.

LUPIN D'HIVER

Ver de la mouche

C'est le **parasite le plus fréquent** et le **plus grave** sur lupin d'hiver. Il provoque un dépérissement de la plante dû aux galeries dans les racines.

Contre ce ravageur qui recherche des terrains fraîchement retournés pour déposer ses pontes, il est impératif de réaliser un labour avec enfouissement des pailles, environ 3 semaines avant le semis.

Un **traitement** au **PYRISTAR** (chlorpyrifos-ethyl) à la dose de **0,3 l/quintal** de semence est indispensable en complément de la lutte agronomique, pour obtenir une bonne efficacité contre ce ravageur.

Anthracnose

C'est la **maladie** la plus **grave** sur lupin. Les traitements en végétation ayant depuis longtemps montré leur insuffisance, il est impératif de passer par un **traitement de semence approprié**.

La meilleure protection est assurée par le **GERMIPRO UFB**, à la dose de **0,3 l/quintal** de semences.



COLZA

Grosses altises

Premières captures

Service Régional de la
Protection des Végétaux
13, route de la Forêt
86 580 BIARD
Tél.: 05.49.62.98.25
Fax: 05.49.62.98.26

Directrice gérante :
S. DUTARTRE

Site internet :
www.srpv-
poitoucharentes.com
E-mail :
srpv.draf-poitou-
charentes@agriculture.gouv.fr

Publication périodique
C.P.P.A.P. n°2139 AD
ISSN n°02294 470

